

★ 国外信息 ★

塑料制品中的双酚A 可能对儿童有害



美国国立卫生研究院公布的一项最新研究结果显示,奶瓶、杯子等塑料制品中的双酚A可能会对儿童健康造成不利影响。

《洛杉矶时报》日前援引这份研究报告说,塑料制品中的双酚A可能影响婴幼儿的成长发育,并对儿童大脑和性器官造成损伤。

多国科学家 将绘制人类癌症基因组图谱

国际癌症基因组协会将开展一项与人类基因组计划具有同等重要意义的癌症研究计划,集世界各国的科学家之力,绘制完整的人类癌症基因组图谱。

该协会日前在英国伦敦正式成立,目前有英国、美国、加拿大、法国、中国、印度、日本、新加坡、澳大利亚和欧盟10个成员。

尽管癌症常常由环境致瘤物引发,但从根本上讲,它是一种DNA缺陷疾病。DNA缺陷会导致基因变异(有些由致瘤物诱发),从而使某些细胞开始不受控制地分裂。

唇腭裂修复 选错时机 会害了孩子 ——有五成患儿需“二次回炉”做手术

“不少患唇腭裂的新生儿,因家长急于在3个月内为其做手术,导致修复失败。事实上,手术最佳时间应在婴儿3个月大以后。”

已公认的唇腭裂发病因素有六类。一是遗传,20%~30%的患儿具有遗传因素;二是环境污染影响,如妇女怀孕早期曾受家居装修材料污染影响。

专家介绍:唇腭裂治疗目的是为了恢复正常的上唇形态和语言功能,是系列性治疗,其过程的每项缺一不可。而为了获得满意的手术效果,修复手术时间的选择非常重要。

特别爱哭闹的患儿可给予镇静剂,对稍大懂事的患儿应做好说教工作,讲清哭闹的危害关系。另外,患儿术后下地活动时,应注意不要摔倒。

对患儿及家长造成严重心理创伤 据张志光介绍,唇腭裂是一种较常见的出生缺陷,不仅严重影响孩子面部美观,还因口、鼻腔相通而影响其发育。

患儿切忌一出生就做修复手术 张志光告诉记者,根据该院收治唇腭裂患儿的情况来看,超过五成是各地送来的“二次回炉”患儿。

为此,专家提醒家长,为唇腭裂孩子治疗很可能要打“持久战”,即孩子一生都将面临一系列治疗。

对于做唇裂或腭裂修补术的患儿,要特别注意饮食问题。住院期间患儿要进流食、半流食,如牛奶、果汁、面片、蛋羹等。

★ 专家在线 ★

购买食用 碘盐有讲究

缺碘的危害不仅是甲状腺肿大,更会造成婴幼儿不同程度的脑发育障碍。全民食盐加碘是防治碘缺乏病最重要和最基本的公共卫生措施。

他还说,因为碘元素及其他元素处于高温、潮湿环境中,或遇到食醋等酸性物质时很容易挥发掉,所以消费者在购买、保存和食用碘盐时应该注意。

专家还建议,对于不宜食用碘盐的甲状腺疾病患者,可凭医生证明到盐业部门指定的商店购买非碘盐。

在汶川地震中,高唱《团结就是力量》为大家鼓劲的初三女学生郭婷婷,左腿被挤压受伤最终被截肢。

服板蓝根冲剂也需对证防副作用

时下,板蓝根冲剂在药店中作为“非处方药”老百姓可随意购买,因此成为大众家中常备的中成药。也因此一些人服用板蓝根冲剂成了“家常便饭”。

对于小孩来说,即使是病毒性感冒也不宜随意服用板蓝根冲剂。这是由于小孩身体娇弱,而板蓝根冲剂中的板蓝根、大青叶等均属大苦大寒药物。

还可能引起蓄积中毒。另外,少数人对板蓝根会有过敏反应,表现为头昏眼花、气短、呕吐等。

2008全国卫生专业技术资格考试系列丛书 考试必备

Table listing exam materials for 2008 National Health Professional Qualification Exam, including categories like National Clinical Assistant Physician, and various exam guides and practice books.

Table listing exam materials for 2008 National Health Professional Qualification Exam, including categories like National Clinical Assistant Physician, and various exam guides and practice books.

南昌市中西医结合医院 开设全省首家戒烟门诊

近日,江西省首家戒烟门诊在南昌市中西医结合医院正式开诊。该门诊配备了高年资的专业医生、护士,旨在降低人群吸烟率,减少吸烟对健康的危害。

玉林市中医院 开展义诊活动

6月初,玉林市中医院10余名医生顶着烈日,在玉林市政协对口支援村——福绵管理区城均镇万福村,为村民们义诊。